



Horizontal

6. Tipo de provisória produzida com resina termopolimerizável e que apresenta maior resistência, portanto deve ser utilizada em casos onde o paciente necessitará utilizar a provisória por mais tempo, principalmente devido a cirurgias periodontais?

8. Nome dado à região entre dois dentes situada abaixo do contato entre duas faces, a mesial e a distal por exemplo.

10. Tarefa executada na provisória com a intenção de torná-la mais lisa e brilhante.

Vertical

I. Quando um dente é desgastado para receber uma restauração indireta e este preparo é posicionado no interior do sulco gengival, devemos colocar uma provisória bem

adaptada para evitar que a gengiva ocupe o espaço deixado pelo desgaste dentário. Se a provisória não for adaptada adequadamente ocorre um crescimento gengival na região este crescimento é conhecido como _____ gengival.

IV. O tecido gengival é composto na sua maioria por tecido epitelial e tecido _____.
O tecido gengival é composto na sua maioria por tecido epitelial e tecido _____.
O tecido gengival é composto na sua maioria por tecido epitelial e tecido _____.
O tecido gengival é composto na sua maioria por tecido epitelial e tecido _____.

VI. Nome dado à face proximal de um dente

que é voltada para a região anterior da arcada dentária.

VIII. Nome comercial de um hidróxido de cálcio muito utilizado como material de cimentação provisória?

XI. Tipo de término criado pelo desgaste do dente com o objetivo de alojar uma restauração indireta principalmente quando utilizamos as pontas diamantadas preconizadas pela técnica da silueta? (chanfrado)