



### Horizontal

**6.** Tipo de provisória produzida com resina termopolimerizável e que apresenta maior resistência, portanto deve ser utilizada em casos onde o paciente necessitará utilizar a provisória por mais tempo, principalmente devido a cirurgias periodontais?

**8.** Nome dado à região entre dois dentes situada abaixo do contato entre duas faces, a mesial e a distal por exemplo.

**10.** Tarefa executada na provisória com a intenção de torná-la mais lisa e brilhante.

### Vertical

**I.** Quando um dente é desgastado para receber uma restauração indireta e este preparo é posicionado no interior do sulco gengival, devemos colocar uma provisória bem

adaptada para evitar que a gengiva ocupe o espaço deixado pelo desgaste dentário. Se a provisória não for adaptada adequadamente ocorre um crescimento gengival na região este crescimento é conhecido como \_\_\_\_\_ gengival.

**IV.** O tecido gengival é composto na sua maioria por tecido epitelial e tecido \_\_\_\_\_.  
O tecido gengival é composto na sua maioria por tecido epitelial e tecido \_\_\_\_\_.  
O tecido gengival é composto na sua maioria por tecido epitelial e tecido \_\_\_\_\_.  
O tecido gengival é composto na sua maioria por tecido epitelial e tecido \_\_\_\_\_.

**VI.** Nome dado à face proximal de um dente

que é voltada para a região anterior da arcada dentária.

**VIII.** Nome comercial de um hidróxido de cálcio muito utilizado como material de cimentação provisória?

**XI.** Tipo de término criado pelo desgaste do dente com o objetivo de alojar uma restauração indireta principalmente quando utilizamos as pontas diamantadas preconizadas pela técnica da silueta? (chanfrado)